

The urease virulence factor of Helicobacter pylori is required to induce HIF-1alpha activity in gastric cells

Por: [Valenzuela, M](#) (Valenzuela, M.)^[1]; [Cerdeira, P](#) (Cerdeira, P.)^[2]; [Bravo, D](#) (Bravo, D.)^[2]; [Quest, AFG](#) (Quest, A. F. G.)^[2]

HELICOBACTER

Volumen: 22

Suplemento: 1

Número especial: SI

Abstract de reunión: P05.18

Fecha de publicación: SEP 2017

Tipo de documento: Meeting Abstract

[Ver impacto de la revista](#)

Información del autor

Direcciones:

+ [1] Univ Cent Chile, Santiago, Chile

+ [2] Univ Chile, Santiago, Chile

Editorial

WILEY, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA

Información de la revista

- Impact Factor: [Journal Citation Reports](#)

Categorías / Clasificación

Áreas de investigación: Gastroenterology & Hepatology; Microbiology

Categorías de Web of Science: Gastroenterology & Hepatology; Microbiology

Información del documento

Idioma: English

Número de acceso: **WOS:000423287200224**

ISSN: 1083-4389

eISSN: 1523-5378