

**UNIVERSIDAD DE CHILE**  
FACULTAD DE MEDICINA  
ESCUELA DE KINESIOLOGÍA

# **Orientación Empática de los Estudiantes de Kinesiología de dos Escuelas de la Región Metropolitana.**

Tesis Entregada a la UNIVERSIDAD DE CHILE En cumplimiento parcial de los requisitos para optar  
al grado de LICENCIADO EN KINESIOLOGIA

Sebastián Castañeda Barthelemiez Rodrigo Parraguez Infiesta

DIRECTOR DE TESIS: Kinesióloga Ana María Rojas Serey PATROCINANTE DE  
TESIS: Profesora Sylvia Ortiz Zúñiga

**2006**

Texto completo en: [www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/castaneda\\_s/sources/castaneda\\_s.pdf](http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/castaneda_s/sources/castaneda_s.pdf)



<b>RESUMEN .</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRACT .</b>	<b>3</b>
<b>Texto completo . .</b>	<b>5</b>



---

# RESUMEN

**Objetivo:** Conocer la Orientación Empática de los alumnos de la carrera de Kinesiología de dos escuelas de la región metropolitana.

**Diseño:** Este trabajo corresponde a una investigación descriptiva de corte transversal

**Participantes:** De los 351 alumnos de los niveles I, III y V de la carrera de kinesiología de la Universidad de Chile y Universidad Mayor, 274 participaron.

**Método:** Se aplicó la Escala de Empatía Médica de Jefferson (*EEMJ*) a los alumnos participantes. Se usó el programa computacional estadístico SPSS 14.0 para el análisis de los datos, mediante la *prueba U no paramétrica de Wilcoxon-Mann-Whitney* y la *prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis*.

**Resultados:** Se obtuvieron mayores puntajes en la *EEMJ* con significación estadística en el tercer y quinto nivel de la carrera con relación al primero ( $p < 0,05$ ). Las mujeres de ambas universidades en conjunto obtuvieron mayor puntaje que los hombres. La comparación del puntaje con el sexo en ambas universidades por separado (sin comparar nivel) no arrojó resultados significativos para ninguna de ellas.

**Conclusiones:** Existen mayores puntajes obtenidos en la *EEMJ* a medida que los alumnos están en niveles más avanzados de la carrera de kinesiología siendo esta diferencia significativa en ambas universidades. Los puntajes obtenidos en la *EEMJ* no tienen significación estadística en relación a la variable sexo en ambas universidades.

**Palabras claves:** *Empatía, Orientación empática, Escala de empatía medica de*

*Jefferson (EEMJ).*

# ABSTRACT

**Objective:** To explore the empathetic orientation among physical therapy' students in two schools of *Región Metropolitana*.

**Design:** Descriptive Cross-sectional study

**Participants:** Of 351 students from the first, third and fifth years of the Physical Therapy's career from the Universidad de Chile and the Universidad Mayor, 274 participated.

**Method:** The Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE) was used. SSPS 14.0 version software was used for the statistical analysis, through the *U-non parametric Wilcoxon-Mann-Whitney Test* and *non parametric Kruskal-Wallis Test*.

**Results:** Higher scores with statistical significance were obtained in the JSPE in the third and fifth level in relation with the first ( $p < 0,05$ ). Women of both universities obtained higher scores than men. Comparison of the score with the gender at separated universities (comparing no level) did not get significant results for any of them.

**Conclusion:** Higher scores were obtained in the JSPE as students are in advanced years of the physical therapy career, being this difference statistically significant in both universities. Scored got in the JSPE doesn't have statistical significance with the gender in both universities.

**Keywords:** *Empathy, Empathetic Orientation, Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE).*





## Texto completo

Texto completo en:  
[www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/castaneda\\_s/sources/castaneda\\_s.pdf](http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/castaneda_s/sources/castaneda_s.pdf)